

Puteri si radicali.

1. Prin **puterea n** a unui numar real a intrelegem numarul $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$ ($n \in \mathbb{N}$)
a se numeste **baza**, iar $n \in \mathbb{N}$ se numeste **exponent**.

Daca $a \neq 0$ avem $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

2. Prin **radacina de ordin n** sau **radical de ordin n**, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ a unui numar $a > 0$ intrelegem un numar real, pe care il notam cu $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ si care are proprietatea $(\sqrt[n]{a})^n = a$.

Proprietati - puteri:

Fie $n, m \in \mathbb{N}$, $a, b \in \mathbb{R}^*$

a) $a^n a^m = a^{n+m}$, b) $(a^n)^m = a^{nm}$, c) $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$, d) $(ab)^n = a^n \cdot b^n$,

e) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.

Proprietati - radicali:

Fie $a, b > 0$, $n, m \in \mathbb{N}$, $n, m \geq 2$,

a) $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$, b) $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, c) $\sqrt[n]{a^{n-m}} = a^m$, d) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$,
e) $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nk]{a^{mk}}$, f) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$.

3. Daca $a < 0$, $n \geq 3$, $n \in \mathbb{N}$ impar, se numeste **radical de ordinul n al lui a**, numarul negativ notat $\sqrt[n]{a}$ care are proprietatea ca $(\sqrt[n]{a})^n = a$.

Obs.: Proprietatile date in cazul radicalilor din numere pozitive sunt valabile si pentru radicalii de ordin impar din numere negative.

4. $\sqrt{A + \sqrt{B}}$ si $\sqrt{A - \sqrt{B}}$ se numesc **radicali dubli**. In anumite conditii acestia se descompun in **suma** sau **diferenta de radicali simpli**.

Daca $A^2 - B = C^2$ (este un patrat perfect) atunci:

$$\sqrt{A + \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+C}{2}} + \sqrt{\frac{A-C}{2}} \text{ si } \sqrt{A - \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+C}{2}} - \sqrt{\frac{A-C}{2}}$$

5. O expresie care contine radicali se numeste **conjugata** unei alte expresii care contine radicali, daca produsul celor doua expresii se poate scrie fara radicali.

Cele doua expresii se numesc **conjugate**.

Exemplu:

a) $a > 0, b \in \mathbb{R}$ atunci $\sqrt{a} + b$ si $\sqrt{a} - b$ sunt conjugate deoarece $(\sqrt{a} + b)(\sqrt{a} - b) = a - b^2$,

b) $a, b > 0$ atunci $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ si $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ sunt conjugate deoarece $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$.

6. Puteri cu exponent rational:

a) Puteri cu **exponent rational pozitiv**: definim $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, $a \geq 0$ si $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $\frac{m}{n} > 0$, $n \geq 2$,

b) Puteri cu **exponent rational negativ**: definim $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$, $a > 0$ si $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $\frac{m}{n} < 0$, $n \geq 2$

Proprietati ale puterilor cu exponent rational

Daca $a > 0, b > 0$ si $\frac{m}{n}, \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avem:

$$a) a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m+p}{n+q}}, \quad b) (ab)^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{m}{n}} \cdot b^{\frac{m}{n}}, \quad c) \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{m}{n}} = \frac{a^{\frac{m}{n}}}{b^{\frac{m}{n}}}, \quad d) \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q}},$$

$$e) \frac{a^{\frac{m}{n}}}{a^{\frac{p}{q}}} = a^{\frac{m}{n} - \frac{p}{q}}.$$

Alte proprietati

a) Daca $0 < a < 1$ si $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ atunci $0 < \sqrt[n]{a} < 1 \Leftrightarrow 0 < a^{\frac{1}{n}} < 1$.

b) Daca $a > 1$ si $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ atunci $1 < \sqrt[n]{a} \Leftrightarrow 1 < a^{\frac{1}{n}}$.

Pornind de la aceste proprietati putem stabili urmatoarele:

a) Daca $0 < a < 1$ si $x \in \mathbb{Q}, x > 0$ atunci $0 < a^x < 1$.

b) Daca $a > 1$ si $x \in \mathbb{Q}, x > 0$ atunci $a^x > 1$.

c) Daca $0 < a < 1$ si $x \in \mathbb{Q}, x < 0$ atunci $a^x > 1$.

d) Daca $a > 1$ si $x \in \mathbb{Q}, x < 0$ atunci $0 < a^x < 1$.

e) $(\forall x) \in \mathbb{Q}$ avem $1^x = 1$.